

CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI

CONVULSIONI

	Definizione	Cause
Convulsioni	Contrazione improvvisa, non controllata, con perdita di conoscenza dovuta a ipereccitabilità del sistema nervoso.	Possono essere provocate da epilessia, febbre, crisi glicemiche, astinenze da droghe o farmaci
Epilessia	Patologia cronica, che dà una disfunzione cerebrale transitoria.	Eccessiva o improvvisa scarica di un aggregato di neuroni
Epilessia tipo "assenza"	Perdita di coscienza della durata di pochi secondi (<30), che si presenta più volte nella giornata. Caratteristica dell'età giovanile	Malattie genetiche o metaboliche

Convulsione febbrile

Causa	Sintomi	Cura preventiva
Può dipendere dall'aumento della temperatura corporea, da immaturità del sistema nervoso, predisposizione genetica	Perdita di coscienza, scosse agli arti, irrigidimento o rilassamento muscolare. Successivamente sonnolenza.	Con temperatura >38 dare paracetamolo come da prescrizione medica, fare spugnature fredde, non coprire il bambino

Se la crisi non passa dopo 3-5'

Chiamare ambulanza

Se prescritte dare benzodiazepine

Cosa fare e non fare in caso di attacco epilettico

COSA FARE



METTERE UNA COSA MORBIDA SOTTO LA TESTA



GIRARE IL SOGGETTO DI FIANCO PER FAVORIRE LA FUORIUSCITA DI SALIVA E PERMETTERE LA RESPIRAZIONE



GUARDARE SULL'OROLOGIO QUANTO DURA LA CRISI



ALLENARE I VESTITI STRETTI E TOGLIERE GLI OCCHIALI AL TERMINE DELLE SCOSSE



AIUTARE IL SOGGETTO A RIPrendersi QUANDO LA CRISI TERMINA

COSA NON FARE



CERCARE DI APRIRE LA BOCCA PER IMPEDIRE IL MORSO DELLA LINGUA



INSERIRE QUALCOSA NELLA BOCCA



CERCARE DI BLOCCARE LA PERSONA DURANTE GLI ATTACCHI



SOMMINISTRARE ACQUA, FARMACI O CIBO




Somministrazione delle benzodiazepine

Bambini dai 3-6 anni	Dai tre mesi a sotto i 18 anni
Somministrazione rettale di Micropam: mezza fiala (5 mg) fino ai tre anni fiala intera sopra i 3 anni	Midozolam per mucosa orale (Buccolam) in base alla prescrizione medica



(Farmacia benessere)

■ Sintomi delle intolleranze alimentari:



REAZIONI ALLERGICHE

	Sintomi	Cure
Anafilassi lieve	Arrossamento, pomfi, orticaria, gonfiore delle labbra e palpebre	
Anafilassi moderata	Difficoltà a respirare, respiro rumoroso, nausea, vomito, costrizione alla gola ed al torace	
Anafilassi grave	Cianosi, ipotensione, confusione, collasso, perdita di conoscenza, perdita di feci e urine.	Adrenalina (primo farmaco da somministrare, a risposta rapida). Preparazione pronta da iniettare anche attraverso i vestiti. Chiamare l'ambulanza. Antistaminico e cortisonico.

USO DEL CHENPEN

Estrarre chenpen dall'astuccio.
Togliere la protezione nera dall'ago (indicato da una freccia) e viene via anche la protezione grigia.

Rimuovere il tappo grigio di sicurezza che copre il bottone rosso

Impugnare ed appoggiare il dispositivo sulla parte esterna ed in alto della coscia ad angolo retto

Premere il bottone rosso

Un clic conferma l'uscita dell'ago e l'inizio dell'iniezione. Contare fino a 10" e massaggiare. Capovolgere la protezione nera e ricoprire l'ago. Mettere il soggetto in posizione antishock. Consegnare il dispositivo usato ai medici dell'ambulanza



(allergicamente)

DIABETE

	Definizione	Sintomi	Emergenze
Mellito di tipo 1	<p>Il pancreas non produce più insulina, per cui vanno somministrate più volte al giorno microinfusioni. E' la forma più diffusa in età evolutiva e non può essere prevenuto.</p>	<p>I sintomi iniziano improvvisamente Poliuria (urine abbondanti) Nicturia (bisogno di urinare la notte) Polidipsia (sete intensa) Fame Perdita di peso Irritabilità Stanchezza Nausea e vomito</p>	<p>IPOGLICEMIA IPERGLICEMIA CHETOACIDOSI</p>
Mellito di tipo 2	<p>Il pancreas non produce abbastanza insulina o questa non viene utilizzata correttamente. Si cura con uno stile sano di vita e farmaci ipoglicemizzanti e insulina. Può essere prevenuto.</p>	<p>I sintomi iniziano gradualmente Poliuria Nicturia Polidipsia Visione appannata fatica Zone di cute iperpigmentate</p>	

UTILIZZO GLUCAGEN HYPOKIT

Aprire l'astuccio

Aprire il flacone con la polvere di glucagone.

Iniettare il contenuto diluente della siringa nel flaconcino.

Senza estrarre l'ago, muovere DELICATAMENTE il flaconcino fino a che il liquido è limpido

Estrarre l'ago dal flacone, far salire le bollicine, far fuoriuscire un po' di liquido.

Per bambini sotto i 25 kg iniettare metà dose, sopra la dose intera.

Dopo la somministrazione lo studente può:

non ricordare

avere mal di testa

avere la glicemia oltre i 200

avere nausea

vomitare

Il farmaco agisce in tempi lenti



IPERGLICEMIA

Sintomi	Cure
Sete Bisogno di urinare spesso Irritabilità Stanchezza Febbre Vomito	Valore maggiore o uguale a 300mg/dl: Far bere acqua Farlo andare in bagno Non fare sport Lasciarlo tranquillo Chiamare i genitori